Table 3.10 - Primary hip replacements by type of procedure and antibiotic prophylaxis - A.P. of Bolzano years 2010 - 2019 - updated on the 31th December 2019

	Type of prosthesis				
Antibiotic prophylaxis	**Total**	**Partial**	**Facing prosthesis**	**Grand total**	**%**
Cefotaxime (Claforan)	4.484	421	11	4.916	41,4
Cefuroxime (Curoxim)	2.958	814	15	3.787	31,9
Cefazolin (Cefamezin)	2.042	501	-	2.543	21,4
Ceftriaxone (Rocefin)	96	10	-	106	0,9
Levofloxcaina (Levoxacin)	63	8	-	71	0,6
Vancomycin (Vancocina)	40	19	1	60	0,5
Ceftadizima (Glazydim)	19	2	-	21	0,2
Ampicillin (Amplital)	9	10	-	19	0,2
Ceftizoxina (Eposerin)	15	1	-	16	0,1
Teicoplanin (Targosid)	14	1	-	15	0,1
Gentamicin (Gentalyn, Gentomil, Megental)	6	1	-	7	0,1
Cefamandole (Mandokef, Cedol, Kezolin)	4	1	-	5	0,0
Pefloxacin (Peflox)	4	-	-	4	0,0
Cefepine (Cepimex)	1	-	-	1	0,0
Else	250	60	-	310	2,6
Grand total	**10.005**	**1.849**	**27**	**11.881**	**100,0**

Source: Arthroplasty Register of the Autonomous Province of Bolzano

Note:
* Data relating to institution which use RADAR for data-collection are not available