TEA carotidea vs TEA per eversione: dettagli chirurgici e risultati

Mirko Menegolo MD, PhD

Clinica di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari

Università degli Studi di Padova

Direttore: Prof. F. Grego

Indicazioni all'endoarteriectomia carotidea

**AHA, ESVS,
ESCTS, NASCET, ACAS
trials**

Stenosi carotidEE asintomatiche $\geq 0\%$

RNCR < 3%

(con prospettiva di vita >5 aa)

Stenosi carotidEE sintomatiche $\geq 0\%$

RNCR < 5%

**RNCR = major stroke (disabling or
Lethal)**

Gold Standard nella rivascolarizzazione carotidea

- Zero Relevant Neurological Complication Rate (R N C R) nel periodo postoperatorio (30 days)
- No restenosi emodinamicamente significative o occlusioni
- 0% R N C R in the long term Follow -up

COMPLICANZE NEUROLOGICHE CORRELATE ALL'EA

- a. Ischia da posizionamento
- b. Embolizzazione da manipolazione chirurgica
- c. **Ischemia da clampaggio**
- d. Trombosi postoperatoria precoce (dovuta a)
 - *errori tecnici di sutura - endoarteriectomia incompleta*
 - *cattiva qualità della parete arteriosa endoarteriectomiazzata*
 - *flap intimale in sede di overpass distale*
- i. Embolizzazione di microfalpi residui
- j. Trombosi postoperatoria precoce (primativa)
 - *Disordini coagulativi* - *disfunzioni emodinamiche (cardiache)*
- m. Emorragia Cerebrale
- n. Sindrome da ipoperfusione
- o. Indicazioni scorrette
- p. Altre embolie o trombosi di arterie cerebrali

Tattica operatoria

- Anestesia generale
- Eparinizzazione generale
- Monitoraggio elettroencefalografico continuo
- Uso routinario dilazionato dello shunt

Tecnica operatoria: opzioni

EA + Patch

EA + sutura per prima

} Endoarteriectomia
«CONVENZIONA
LE»

EA x eversione

Bypass

Endoarteriectomia «CONVENZIONALE»

Endoarteriectomia «CONVENZIONALE»

Endoarteriectomia «CONVENZIONALE»

Uso routinario «dilazionato» dello shunt

- Inserimento routinario dopo la rimozione della placca
- Standardizzazione della metodica
- Evita i rischi legati all'inserimento con la placca in situ
 - embolizzazioni- dissezioni della carotide interna*
 - inadeguato controllo dell'overpass distale*
 - malfunzionamento dello shunt (clamp-ischemia)*
- Da al chirurgo la tranquillità necessaria nel tempo sufficiente a completare adeguatamente l'endoarteriectomia e la sutura
- Ha consentito di ottenere il valore più basso di **RNCR**

GP Deriu et al."Clamping ischemia, threshold ischemia and delayed insertion of the shunt during carotid endarterectomy with patch " J Cardiovasc Surg 1999, 40, 1-7

Uso routinario «dilazionato» dello shunt

NO "SHUNT"	1970-1979	RNCR 4.2%
SHUNT DI ROUTINE prima della rimozione della placca	Dati dalla letteratura	RNCR sovrapponibile a "No shunt"
SHUNT SELETTIVO	1980-1989	RNCR 1.9%
SHUNT ROUTINE "DILAZIONATO" dopo la rimozione della placca	1990-	RNCR 0.95%

Il «RAZIONALE» dell'uso del Patch

GP Deriu et al. "The rationale of Patch-graft angioplasty after carotid endarterectomy. Early and long term follow-up" Stroke 1984, 15, 972-79

www.chirurgiavascolarepadova.it

IL «RAZIONALE» dell'uso del Patch

- 1) Consente il prolungamento dell'arteriotomia sulla carotide interna: adeguato controllo dell'overpass distale

GP Deriu et al. "The rationale of Patch-graft angioplasty after carotid endarterectomy. Early and long term follow-up" Stroke 1984, 15, 972-79

Il «RAZIONALE» dell'uso del Patch

- 2) Facilita la
sutura con lo
shunt in sede

GP Deriu et al. "The rationale of Patch-graft angioplasty after carotid endarterectomy. Early and long term follow-up" Stroke 1984, 15, 972-79

www.chirurgiavascolarepadova.it

Il «RAZIONALE» dell'uso del Patch

- 2) Facilita la
sutura con lo
shunt in sede

GP Deriu et al. "The rationale of Patch-graft angioplasty after carotid endarterectomy. Early and long term follow-up" Stroke 1984, 15, 972-79

www.chirurgiavascolarepadova.it

Il «RAZIONALE» dell'uso del Patch

3) Evita le stenosi
“da sutura”

4) Rallenta la
emodinamicità
delle restenosi

**Sutura
diretta**

**Sutura con
patch**

GP Deriu et al. "The rationale of Patch-graft angioplasty after carotid endarterectomy. Early and long term follow-up" Stroke 1984, 15, 972-79

Il «RAZIONALE» dell'uso del Patch

Grego F. et Al. Prospective, randomized study of external jugular vein patch versus polytetrafluoroethylene patch during carotid endarterectomy: perioperative and long-term results. J Vasc Surg. 2003 Dec;38(6):1232-40.

Aburahma AF. Patch closure improves results with carotid endarterectomy. Semin Vasc Surg. 2004 Sep;17(3):243-52. Review.

Endoarteriectomia «PER EVERSIONE»

- A) Di routine
 - B) In casi selezionati
- ?

Vantaggi: materiale autologo, ripristino condizioni anatomiche ed emodinamiche normali

Svantaggi: impossibilità di controllo perfetto dell'overpass distale

Endoarteriectomia «PER EVERSIONE»

Carotidi rettilinee

Indicazioni:

A) Necessità di utilizzare materiale autologo

Endoarteriectomia «PER EVERSIONE»

Indicazione all'endoarteriectomia carotidea per eversione di routine solo in pazienti con **ICAET (internal carotid artery elongation and tortuosity)** prossimale

*Prossimalmente al nervo ipoglosso Ca

*A livello del nervo ipoglosso Cb

*Tra il nervo ipoglosso e glossofaringeo Cc

*A livello del nervo glosso faringeo Cd

*Alla base cranica o iuxtacraniche Ce

*Deriu G et al., Progr in Angiol Vasc Surg, Ed Minerva Medica
1995, 151-170*
www.chirurgiavascolarepadova.it

Endoarteriectomia «PER EVERSIONE»

Razionale: motivazioni tecniche, motivazioni emodinamiche, motivazioni tattiche (inserzione dello shunt).

NO EVERSIONE

EVERSIONE

Endoarteriectomia «PER EVERSIONE» ICAET moderato

(Dopo lo svolgimento e la rettilineizzazione il tallone del becco di flauto arriva all'angolo prossimale della sezione del bulbo)

TRATTAMENTO DELLE
PATOLOGIE
VASCOLARI SOPRA-
AORTICHE: INTERUNIVERSITARIO, Bolzano 20
NUOVE STRATEGIE

Endoarteriectomia «PER EVERSIONE» ICAET moderato

Endoarteriectomia «PER EVERSIONE» ICAET moderato

Endoarteriectomia «PER EVERSIONE» ICAET moderato

Endoarteriectomia «PER EVERSIONE» ICAET moderato

Endoarteriectomia «PER EVERSIONE» ICAET accentuato

Dopo lo svolgimento e la rettilineizzazione il tallone del becco di flauto supera abbondantemente l'angolo prossimale della sezione del bulbo

TRATTAMENTO DELLE
PATOLOGIE
VASCOLARI SOPRA-
AORTICHE: INTERUNIVERSITARIO, Bolzano 20
NUOVE STRATEGIE

Endoarteriectomia «PER EVERSIONE» ICAET accentuato

**TRATTAMENTO DELLE
PATOLOGIE
VASCOLARI SOPRA-
AORTICHE:
NUOVE STRATEGIE**

Endoarteriectomia «PER EVERSIONE»

Accorgimento tecnico: lo shunt come «tutore»

Uso «dilazionato dello shunt» tempi di ischemia da clampaggio e di riperfusione

January 2001- January 2012: 3296 pz.

EA + PATCH (2433)	Tempo medio di clampaggio (min ± DS)
1° clampaggio	3.2 ± 1.6
Riperfusione con Shunt	12 ± 2.9
2° clampaggio	2.7 ± 2.1
EA per EVERSIONE (863)	
1° clampaggio	3.1 ± 2.7
Riperfusione con shunt	10.3 ± 3.5
2° clampaggio	1.7 ± 1.2

EA CAROTIDEA early outcome

January 2001- January 2012: 3296 pz.

	EA + PATCH (2433)	EA per EVERSIONE (863)
STROKE LETALI		
Al risveglio	1 (0.04 %)	0
Entro 30 giorni	2 (0.08 %)	1 (0.11 %)
MAJOR STROKE		
Al risveglio	14 (0.58 %)	4 (0.46 %)
Entro 30 giorni	6 (0.25 %)	2 (0.23 %)
TIA		
Al risveglio	25 (1.03 %)	7 (0.81 %)
Entro 30 giorni	10 (0.41 %)	2 (0.23 %)
R.N.C.R	23 (0.95 %)	7 (0.81 %)
	P: 0.5

EA CAROTIDEA vs EA per EVERSIONE: letteratura

EA CAROTIDEA: letteratura

Meta-analysis di 21 studi

(7 randomizzati 14 non randomizzati):

8530 Eversioni vs 7712 EA convenzionali procedure:

EA per Eversione vs EA convenzionale

- Riduzione significativa dell'RNCR
- Riduzione significativa della long term mortality
- **Late carotid occlusion**

EA CAROTIDEA: letteratura

Cao P. et al. Eversion vs conventional carotid endarterectomy: a systematic review. *Eur J Vasc Endovasc Surg.* 2002 Mar;23(3):195-201.

Rewiev sistematica di
5 trial: 2590 procedure:

EA per Eversione vs EA convenzionale

- RNCR Non differenze significative: 1,7% vs 2.6% OR 0.44
- Any stroke follow-up: 1.4% vs 1.7% , OR 84%
- **Restenosi- occlusione carotidea: 2.5% vs 5.2%**
- **Se si confronta solo con EA + patch non vi sono differenze significative neanche per il tasso di restenosi 2.5 vs 3.9**

Conclusioni

La standardizzazione della metodica nei centri ad alto volume consente il miglior risultato

Sulla base della nostra esperienza l'utilizzo di EA per eversione nei casi di tortuosità della carotide interna (ICAET) in associazione all'uso routinario dilazionato dello shunt e al monitoraggio elettroencefalografico continuo rappresenta una valida metodica con eccellenti risultati del tutto comparabili all'endarterectomia «standard» con patch.

Conclusioni

I risultati estrapolati da grossi studi retrospettici multicentrici vanno sempre valutati in modo **estremamente cauto**, perché spesso le tecniche chirurgiche e le metodiche di follow-up sono poco confrontabili e possono alterare gli end-point

Nell'ambito di casistiche minori, confrontabili per metodica standardizzata, sembra che l'endoarteriectomia per eversione sia associata con un minor rischio di restenosi e di occlusione a distanza. Tuttavia i numeri sono troppo piccoli per stabilire un reale vantaggio rispetto all'endoarteriectomia convenzionale

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE
«SAVE THE
DATE»

Restenosi carotidee

72 restenosi carotidee trattate dal 2000 al
2011

18 restenosi su PATCH
11 su reimpianto
43 su sutura per prima *

72 restenosi trattate

*Prevalentemente provenienti da altra sede