Abb. 01: *Aulacidea hieracii* (Linnaeus)
Foto H. Bellmann;



Abb. 03: [*Aulacidea tragopogonis* (Thomson)]
Foto H. Bellmann;





Abb. 02: [Aulacidea pilosellae (Kieffer)]
Foto H. Bellmann;





Abb. 04: *Aylax minor* Hartig
Kleine Mohngallwespe:
Foto K. Hellrigl, VIII.2006;







Abb. 05: *Aylax papaveris* (Perris)
Mohnkapselgallwespe;
(a) deformierte Mohnkapseln:
mit Larven im Wuchergewebe;
Foto K. Hellrigl: Brixen, VI./VII.2008.
(b) Mischbefall mit orangeroten Larven
von *Dasineura papaveris* (Winn.)









Abb. 05a: Mohnkapselgallwespe.
Befallener Mohn im Freiland.







Abb. 06: *Diastrophus rubi* (Bouché)
Fig. 1: 3 alte Gallen an Rubus:
Lienz (leg. A. Kofler);







Abb. 06: Fig. 2: Galle an Brombeere:
Foto H. Bellmann.



Abb. 07: [*Diastrophus mayri* Reinhard]
Galle an Silber-Fingerkraut:
Foto H. Bellmann.



Abb. 10: *Liposthenes glechomae* (L.)
Fig. 1: alte Galle: A. Kofler,
Lienz 2006 (Foto K. Hellrigl).
Fig. 2: frische Galle an Glechoma:
Foto H. Bellmann.





Abb. 14 *Phanacis hypochoeridis* (Kieffer)Gallen an Ferkelkraut: Fotos G. v. Mörl, 06.09.2004;










Abb. 16: *Xestophanes potentillae* (De Geer)
Gallen an Fingerkraut: Foto K. Hellrigl, VIII.2005.






Abb. 18: *Diplolepis eglanteriae* (Hartig). An Wildrosen: Foto K. Hellrigl: VI./VIII.2004/08.







Abb. 18b: *Diplolepis centifoliae* Hartig (?). An Wildrose: Foto K. Hellrigl: Raas, Okt.2008.



Abb. 19: *Diplolepis mayri* (Schlechtendal). An Wildrosen: Foto K. Hellrigl: 1999 - 2008.

























Abb. 20: *Diplolepis nervosa* (Curtis). Foto K. Hellrigl: Auer 31.07.2004; Rovereto 08.2006;





Abb. 21: *Diplolepis rosae* (Linnaeus). Foto K. Hellrigl: Brixen Umg., 03.2005 – 09.2008;













Abb. 22: *Diplolepis spinosissimae* (Giraud). Foto K. Hellrigl: Brixen Umg., 08.2004 – 06.2008.





















Abb. 23: [*Pediaspis aceris* (Gmelin)]
Fig. 23a: Wurzelgallen,
leg. Bellmann, Foto. K. Hellrigl;
Fig. 23b: Blattgallen:
Foto H. Bellmann, 04.06.2005;









Abb. 24. *Andricus amblycerus* (Giraud) – Foto K. Hellrigl: Pomarolo, X.2007/08; vgl. Henschel (1888: Fig. 10: *Cynips amblycera*; Fig. 11:C. galeata; Fig. 12: Cynips caliciformis)





















10
11
12

Abb. 25: *Andricus amenti* Giraud
[= *A. giraudianus* D. T. & Kieffer]; Foto K. Hellrigl;









Abb. 26: *Andricus aries* (Giraud)
„Bockshorngalle“ mit 3 Gallen von *A. kollari*:
K. Hellrigl: Brixen (import.), Stieleiche, XI.2006;
Abb. 26b: kurzhornige Gallen: idem VIII.2008:
zusammen mit Zipfel-Gallen von *A. corruptrix*;





















Abb. 27: *Andricus burgundus* Giraud. Foto K. Hellrigl: Castelfeder, Zerreiche, 28.04.2005;





Abb. 28: *Andricus caliciformis* (Giraud), K. Hellrigl: Pomarolo, Flaumeiche, VII.-IX.2008; vgl.: Henschel (1888: Fig. 12: *Cyn. caliciformis*).



















Abb. 29: *Andricus callidoma* (Hartig),
(a) Foto K. Hellrigl: Brixen (import.), an Stieleiche mit *A. kollari*, VIII.2008.
(b) Foto H. Bellmann: VII.2007.



Abb. 30: *Andricus caputmedusae* (Hartig)
Foto K. Hellrigl: Castelfeder, Rovereto, Pomarolo;
vgl.: Henschel (1888: Fig. 28: *Cynips caput medusae*);






























28

Abb. 31: *Andricus conglomeratus* (Giraud), Foto K. Hellrigl: Brixen (import.), Stieleiche, 2006/08; vgl. Henschel (1888: Fig. 6: *Cynips conglomerata*; Fig. 7: *Cynips lignicola*);








Abb. 32: *Andricus conificus* (Hartig), Foto K. Hellrigl: Pomarolo, Flaumeiche, 2007/08.








Abb. 33: *Andricus coriarius* (Hartig)
Foto K. Hellrigl: Etschtal;
(a) frische Gallen:
Foto K. Hellrigl: Etschtal;
(b) alte Gallen:

































Abb. 34 [*Andricus coronatus* (Giraud)]
Bei Henschel (1888: Fig. 9 „*Cynips glutinosa*“): *C. corontata (r. unten)* mit *C. mitrata* (l. unten) und Stammform *C. glutinosa* (oben) abgebildet.



Abb. 35: *Andricus corruptrix* (Schlechtendahl)
Foto K. Hellrigl:
(a.) TN, Pomarolo, VIII.2008;
(b.) Brixen (import.), Stieleiche, VIII.2008;
(e.) aus Gallen: agame Weibchen, V.-VI.2008.





















Abb. 36: *Andricus curvator* Hartig, Foto S. Minerbi & K. Hellrigl: Kaltern.




Abb. 38: *Andricus cydoniae* (Giraud), Foto K. Hellrigl: TN, Pomarolo, VII-VIII.2008.














Abb. 39: [*Andricus dentimitratus* (Rejtö)]
Fig. 1: Kieffer 1901, Pl. XXII, 2.a (= *Cynips mayri* Kieff.); Fig. 2: Foto H. Bellman: 04.09.2006.






Abb. 40: *Andricus fecundator* (Hartig) – Eichenrose „Artischockengalle“ Foto K. Hellrigl: Südtirol-Trentino, 2005/08.





















Abb. 41: *Andricus galeatus* (Giraud), Foto K. Hellrigl: Pomarolo, VII.-VIII.2008; vgl. Henschel (1888: Fig. 11: *Cynips galeata*);




















Abb. 42: [*Andricus gallaetinctoriae* (Olivier)] Färbergalle: “Levantinische” oder “Aleppo”-Galle:
(a) nach Thomas Schoepke (Gallen: Humboldt-Museum Berlin);
(b) Foto K. Hellrigl: Gallen Pharmaziemuseum Peer (Brixen) aufgelegt auf Fig. 132-133 (Dalla Torre & Kieffer 1910).







Fig. 132. Fig. 133.
C. gallae-tinctoriae, Galle (1/1).

Abb. 43: *Andr. gallaeurnaeformis* (Fonscol.), Foto K. Hellrigl: Pomarolo, Okt. 2004, 2007/08;















Abb. 44: *Andricus gemmeus* (Giraud), Foto K. Hellrigl: Pomarolo, IX-X.2007/08.








Abb. 45: *Andricus glandulae* (Hartig), Foto K. Hellrigl: Eisacktal, IX.-X.2005/06.






Fig. 1.
Gallen von *Cynips tergestensis* Kieffer.



Abb. 46: [*Andricus glutinosus* (Giraud)]
(a.) Foto H.-J. Buhr 2007: Burgenland, 04.06.2005.
(b.) Abb. Gräffe 1905a: Fig. 1 [= *Cynips tergestensis* Kieffer].

Abb. 47: *Andricus grossulariae* Giraud
Foto H. Bellmann, 08.04.2007.
(b) Hellrigl: 28.10.2007;
(c.) Henschel (1888: Fig. 27: *Andricus grossulariae*);









Abb. 48: [*Andricus hartigi* (Hartig)]
(a.) Kieffer 1901: Pl.X,
Fig. 6 u. 6a (Cynips hartigi Koll.) und
Fig. 7 u. 7a (Cynips truncicola Pasz.):
E. Lamberton, del.
(b.) Abb. von F. Redi (1668): nach Bernardi et al. 1997;



Abb. 48c: [*Andricus hungaricus* (Hartig)]
Kieffer 1901: Pl.XII,
Fig. 8 (Cynips hungarica Hart.) und
Fig. 6 (Cynips conglomerata)




Abb. 49: [*Andricus hystrix* Trotter] Kieffer
Foto H. Bellmann, 2006;

